



# آزمایشگاه دکتر امینی

تشخیص طبی و آسیب شناسی  
۱۳۵۷

## راهنمای تهیه نمونه جهت آزمایش کشت ادرار

بهترین نمونه جهت آزمایش کشت ادرار ، اولین نمونه ادرار صبحگاهی می باشد .

قبل از انجام آزمایش از مصرف بیش از حد آب و مایعات دیگر خودداری نمائید .

جهت نمونه گیری آزمایش کشت ادرار حداقل از سه روز قبل نباید آنتی بیوتیک مصرف

کرده باشید. (در صورت مصرف آنتی بیوتیک باید به پزشک و آزمایشگاه اطلاع دهید) .

\* قبل از نمونه گیری باید ناحیه ادراری- تناسلی را ابتدا با آب شستشو داده و بعد

کاملاً با محلول ضدعفونی کننده تمیز کرده و سپس آب کشی نمایید .

پس از خشک شدن، قسمت اول ادرار خود(چند قطره) را بیرون ریخته و قسمت میانی را

در ظرف مخصوص آزمایش جمع آوری نمایید و قسمت آخر ادرار خود را نیز دور بریزید.

\* در نوزادان و کودکان زیر دو سال برای نمونه گیری باید از کیسه های سترون شده

مخصوص جمع آوری ادرار ( Urine Bag ) که متناسب با جنسیت کودک (پسرانه یا

دخترانه ) است استفاده کنید . کیسه ادراری نباید بیش از ۴۵ دقیقه به مجرای ادرار

متصل باشد. وقتی حدود ۱۵-۱۰ میلی لیتر ادرار در کیسه جمع شد باید سر آن را تا

نموده تا بسته شود و بلافاصله به آزمایشگاه انتقال دهید . (حداکثر ظرف دو ساعت)

میزان نمونه جهت انجام آزمایشات ادرار حدود ۳۰ میلی لیتر(نصف لیوان) می باشد .